今 は 昔 物 語

福 井 玉 夫

東京市小石川區原町二七

予が蜘蛛學會の評議員たるを今の若き方々は或は訝り給ふならんも本誌1卷 2號に誌し置きつる「蜘蛛採集の思ひ出しを讀み給はゞ嘗ての日予が蜘蛛研究 に熱心なりし次第を識りて必ずしもお門違ひにあらざるを諒とせらるゝなるべ し。中學生の頃自ら日本の蜘蛛類圖說の編述を思ひ立ち圖と記載を作り一つ二 つと増し行くを築しみとしたりしが中途にて挫折し完成に至らずして止みぬ。 此の由を幹事の方々に不闘物語りしに其の圖說を見まほしと需めて止まず。頃 日筺底な探りて測らずも其の内の2葉を見出したり。餘のものは何處に行きし や今は知れず。2葉何れも四六倍判の用紙に表に全形及び部分圖を描き裏面に 細字にて記載を施しあり。No. 1 (即ち Plate I) とせるはふたすじおゝかみぐ も(假稱)としたるが。村氏に據ればキクヅキドクグモ Lycosa pseudoannulata Kishida たらんと云ふ。亦 No. 2 (卽ち Plate II) にはくろきばしろくもなる 假稱を附したるが之も植村氏に據れば今日のハマキフクログモ Clubiona japonicola Boesenberg et Strand なりと云ふ。五郎時致ならずとも此の古き圖を見 るにつけ憶ひ出だすは二十餘年、予にとりては懷しき成績品なり。幹事の方々 より是非此の圖說を誌上に公にせよと迫らるゝまゝ決して予の本意にはあらざ るも其の勸設にほだされ初春のお笑ひ草として當時の儘の圖と記載とを掲ぐる こと」はなしぬ。覽る人其の心して一途に咎め給ふ勿れ。

全體 泥褐色ノ種ニシテ背面ノ模様上額毒爪脚紡績器等ハ多少他色ナリ體長2-2k分 脚共凡8-9分頭胸部ハ腹部ヨリ短ナレドモ輻廣ク8厘許アリー體ニモチ密生シ唯眼,背 面, 毒牙, 爪ノミモナ缺り所々剛毛ナ生せり。

頭部 頂へ黒色ニシテ側面ハ黄褐色ナリ牛圓狀チ呈シ毛キ密生シ殊 ニ 前面及眼ノ周圍 ニ長キ黑色ニシテ光澤アル剛モチ粗生ス殆ンド胸部ト同一ニシテタメスコシリ側面 ニ 於テクピレタルチ以テソレト知ラル、ノミナリ幅凡5厘長サ凡ソ4厘上頭へ二分ニシテ基部ハ太ク且强ク黄白色チ呈シ先端ノ 毒爪ハ赤褐色チ成ス下顎ハ五節ニシテ全體凡ソ2分基節ハ赤黄色咀噶所ニ於テ白毛チ生ズ其他ノ節モ 皆毛チ密生先端ノ節チノソイテ他ハ皆 数本ノ 黑色ノ剛毛チ有 ス 雄ニアリテハ先端ギポシ狀ニ膨大シ生殖器チ成ス第二節ハ最長 扁平ナリ第三節最小第四第五此レニ次ケ眼ハ八個顱頂眼最大後左,右側眼之ニ次ギ額眼及前左,右側眼ハ発ンド同大ニシテ頷眼ノ凡五分ノーナリ黑褐色ニシテ光リ前左,右側眼ハ深ク毛中ニ存在ス全體ヤ、倒梯形ニ排列シ左右後側眼ハ最モ 相離レ顱項眼ハヤ、相接近シ額眼及左,右前眼ハ殆ンドー直線ニ列シ其兩側眼ノ距離ハ顱頂眼ノ距離ョリ短シ。


胸部 殆ンド囮形ヲ成シ中央ニ雑ニー條ノ 眞照線其兩側ニ太キ黄白條ヲ有シ尚眼ノ後部ニ於テ三條ノ淡褐黄腺ヲ有ス然シテ尚縁ニ於テ黑條ヲ有シント平行シテ黄白色ヲ呈ス中央ノ横條ト縁ノ黄條トノ間ハ淡色ニシテ中央達ヨリ上部ニ モナク下部ニ下方ニ向テモヲ生ズ胸板ハ淡灰色長キ白モヲ上下ニ密生ス殆ンド圓形ヲ成シ長サ凡ソ 4 厘幅 沿厘ヲ有ス肢ハ全體淡黄灰色ニシテモヲ密生シ第七節 ヲノソク外皆少數ノ黑長剛モヲ粗生ス向少シク斑色ヲ呈シ節ノ接合點ハヤ、濃色ヲ成スヲ常トス長 サ第一第二第三對共殆ンド同長ニシテ各 2.8 分第四對ハ最長ニシテ凡ソ 4.2 分ニ達ス 爪ハ二個ニシテ褐色先端鋭シ。

腹部 大ニシテ大凡長サー分五厘巾八厘ヲ算シ圓シ尻端ニ至リテ次第ニ少マル灰褐色ニシテ上面ニハ褐色モチ生 ジ 中分ヨリ下面ハ長キ絹糸狀ノモチー面ニ密生シ肺蘂ノ在所ヲ少シク表面ニ表ス上面ノ 模様ハ黄褐灰色ノ蛇目狀ノ點ヲ四對程有シニ列ニ列ピ後方程對間ノ距離接マレリ然テ上方ニテハ其中間ニ明瞭ナラザル條 チ 備フ紡績器ハ六個正方形ニ排列シ大ナル者其四隅ヲ擁ス肢ト同色モヲ密生ス長サ凡 1½ 厘中 5 厘ヲ算ス小ナル者ハ中央ニ在リ。

No. 2 くろきばしろくも (假稱)

全體 黄白色ノ種ニシテ上類, 眼, 爪, 下類ノ外ハ皆同色多少濃色チナス所アリ長サ凡 ソニ分最モ廣キ幅員凡五厘足共全體凡四分五厘厚サ ハ 普通ナリトス全體ニ白毛チ密生シ 毒爪, 眼, 爪, 胸板ハ無毛ナリトス尚腹部ノ前端及上類ニハ黑色ノ剛毛チ粗生ス模様トテ ハ川ニナシの

頭部 色ハ體色ョリヤ、濃色ニシテ殆ンド胸部ト區別ナシ微カニ横面ニ於 テ四所アル 為ソレト知ラル幅凡ソ四厘許ナリ上顎ハ黑褐色ニシテ毒爪 ハ 半透明赤色チ帶ア大ニシテ 上面ヨリ明ニ前方ニ突出 ス 白毛サヤ、密生シ毒爪ハ長シヤ、不正形チナス下顎基節ハ大 黒褐色毛サ有スト顎縁、長り黄白色白毛サ密生シー二三節=黒剛毛 ノ 長キ サ粗生ス三四節最短ニシテ 第五節篇平トナリテ下面ニるニアリテハ精纏 ラ有ス精液嚢 ハ黒褐色ニシテ 無毛 先端=短カク尖レル陰莖サ有スコレモ同 ジ 黒褐色ニシテ先端鋭シ尚第四節端=黒色 ノ刺サ有ス眼へ八個ニシテ共ニヤ、曲レル二線ニ並列シ顱頂眼最大ニシ テ 後左右側眼モ 殆ンド同大ニシテ額眼及左右前側眼モ 同大ニシラ前二對ヨリハヤ、小ナリトス黒色ニシテ前列ハ互ニ密接 シ後列ハ互ニ相離ル眼ノ周圍ノ眼ハヤ、長毛サ有ス尚前列ト後列ノ距モ少ナリトス。



胸部 頭部=大ギテ同シリ黄白色正橋園形チナス背面=一箇 / 短黒縫線チ有ス一面= 粉狀ノ密毛チ有シ宛然裸出セル如シ後方=至ツテ漸々ニ下ル胸板ハ黄白色温 キ 光澤チ有 シ無毛長橋園形ナリ肢ハ黄白色白毛チ密生 シ 基節及第七節チ除キテノ外ハ黒キ長剛毛ラ 刺ノ如り數本粗生ス第一對ノ肢ノ腿節ハ短カシ長サ凡 ソ 第一對ハー分八厘第二對ハ二分 五厘第三對ハ二分第四對ハ二分七厘許アリ爪ハ黒色二個チ育ス。

腹部 大ニシテ同ジク黄白色ャ、長倒卵形チナス全體白色毛 チ密生シ腹ノ半下面ハ殊ニ密生ス模様トテ・ナケレド モ背面前方ニャ、遮色ノ判明モザル太キ縦線チ有シやペマデ至ラズシテ消エ凡一分二厘幅凡リ五厘チ算ス紡績器ハ六箇內四箇 ハ 大ニシテ四隅ニ出シ小二個ハ中央ニ 陸レテ外ヨリ見エズ黄白色ニシテ全體白キ密モチ有シ大ニシテ凡ソ長サ二厘幅八毛ラ算シ外面ヨリ腹部ノ外ニ突出シタレバ能ク見エロ

明治四十二年十二月一日攝津國西成郡十三村 ノ 土中産ニョル尚 8 ニョリテ檢定記戴シタリ。

「パラオ島の蜘蛛二種に就て」の記事訂正

植 村 利 夫

予は本誌 Vol. 1. No. 4. pp. 146-147 に「パラオ島の蜘蛛二種に就て」と題して高橋 敬三氏採集の Argiope reticulata と Leucauge sp. に就て發表しておいたが、其の中後者の 習性に就て

「高橋氏のお話では此の蜘蛛は向ふでは家の中へ侵入して來て書棚の間等へ澤山糸を張り廻して困るさうで、これはコガネグモ屬の種類としては寧ろ不思議な習性である。」

と述べた部分がある。 所が其の後高橋氏の御注意を受けてまことに申譯ないことをしたと思つた次第であるが、これは全く予の開達ひで、此の蜘蛛は全然この様な習性なく次に記す話と混同してぬたものであったことが解つたからこゝに訂正して採集省高橋氏並に讀者諸氏にお詫びする。次の話とは即ち次の通りである。

本の背表紙とか本の間とかに入つて來て巢を造るのは(內地でも見られるものと同種か否かは解らぬが)彼の有名な蜘蛛狩をする寄生蜂の一種で,前記の様な場所に泥の巢を營み其の中に Leucauge sp. を澤山入れてゐるのである。 其の一つの泥の巢の中には蜘蛛が五六匹入れられており,調査した結果蜘蛛は 巢の中では半殺しの狀態にされてゐたとの事である。

不可解と思つてぬた Leucauge sp. の習性の記事が誤りであつたことが解ったと同時に 又寄生蜂に就ての新しい事實を知ることが出來て非常に嬉しく思ふ。 高橋敬三氏に深謝 の意を表する。(昭和十二年三月十日記)